

**DATOS GENERALES**

Nombre comercial: TARGO  
 Concentración: 10%  
 Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)  
 Índole: Herbicida  
 Registró INSAI20210021012972023  
 Titular y Distribuidor: AGROCASA C. A.  
 Dirección: Urb. San José de Tarbes Edf. Centro Tarbes PISO 4 OFC 4-2  
 Valencia-Carabobo Tel. 02418242270

**Clasificación Toxicológica:**



**LIGERAMENTE TOXICO**



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Ingrediente Activo:

**QUIZALOFOP -P- ETYL**

**Modo de acción:**

TARGO: Es un herbicida selectivo, es absorbido por las raíces y hojas, en una o dos horas es traslocado por toda planta destruyendo los tejidos meristemático apicales y brotes subterráneos. Los primeros síntomas aparecen en 2-7 días. La necrosis afecta las hojas jóvenes y yemas produciendo la muerte a los 7-15 días.

**Aplicación:**

Aplicar en postemergencia o postrasplante del cultivo. Se aplica en cuando las malezas presenten 2-10 hojas los resultados se observan a las 2-3 semanas. Aplicar una (1) sola vez por ciclo de cultivo para evitar la resistencia al producto.

**Preparación de la Mezcla:**

Para preparar la mezcla de aplicación, agite bien el envase antes de dosificar, efectuar una pre-dilución de la dosis de uso por hectárea, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla.

**Compatibilidad:**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares usados comercialmente.

**Dosis y plagas a controlar:**

Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha	P.R
CARAOTA ( <i>Phaseolus vulgaris</i> (L))	Pira ( <i>Amarantus spp</i> ) Escoba ( <i>Sida sp</i> ) Granadilla ( <i>Panicum fasciculatum</i> ) Paja Peluda ( <i>Rottboelia exaltata</i> ) Lecherito ( <i>Chamaesyce spp</i> )	0.75-1	24 HORAS

**Presentación:** Envases de 1l -4l