

TALOXIL

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO”.

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y MEDICINAS”.

ADVERTENCIA O PRECAUCIONES DE USO: Este producto puede causar irritación de la garganta, ojos, piel y membranas mucosas. Use equipo de protección adecuado (guantes, máscara, lentes, camisa, pantalón largo, botas de goma y sombrero). Evite contacto con los ojos, piel y ropa, lávese muy bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo, no fume, no beba durante la aplicación del producto. Debe ser almacenado en un lugar ventilado fresco y seco. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo esté usando. Durante el transporte se debe tener cuidado que los envases no estén rotos ni deteriorados a fin de evitar derrames. Distribuir la carga de forma homogénea en toda la superficie del vehículo.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede provocar Diarrea, Disnea, Ataxia, Disminución en la motilidad, Irritación ocular, Irritación dérmica, dermatitis, Temblor, Piloerección.

PRIMEROS AUXILIOS: Retirar del área de exposición ante de cualquier contacto con el producto. Si es a través de la piel lavar con abundante agua y jabón. Si el contacto es ocular, lavar con abundante agua. Si el producto ha sido inhalado, retirar del área, vigilar vías aéreas. Si el producto ha sido ingerido, no inducir el vomito. Trasladar al centro de salud más cercano para realizar medidas de descontaminación. Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO : No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático y de sostén.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE”.

“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVARLOS CON ABUNDANTE AGUA FRESCA Y SI EL CONTACTO FUESE CON LA PIEL, LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN.”

“NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE LAS OPERACIONES DE MEZCLA Y APLICACIÓN.”

“CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO.”

“DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO CAMBIESE, LAVE LA ROPA CONTAMINADA SEPARADA DEL RESTO DE LA ROPA USANDO GUANTES PROTECTORES. BAÑASE CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN.”

“UTILICE ROPA PROTECTORA DURANTE EL MANIPULEO APLICACIÓN Y PARA INGRESAR AL ÁREA TRATADA EN LAS PRIMERAS 24 HORAS”.

“DESPUÉS DE HABERSE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, ENJUÁGUALO 3 VECES CON AGUA Y VIERTA LA SOLUCION AL TANQUE DE ASPERSIÓN MIENTRAS ES LLENADO. LUEGO INUTILICE EL ENVASE TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y ALMACÉNELO EN UN LUGAR SEGURO” “POR NINGÚN CONCEPTO EL ENVASE DEBE SER REUSADO”.

INFORMACION ECOLOGICA Y MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL:

TALOXIL: Es un fungicida inmóvil y no persistente en suelo, persistente en agua sin potencial de lixiviación, y baja volatilidad. Prácticamente no tóxico para aves, abejas y lombriz de tierra. Altamente tóxico para organismos acuáticos. Aplique con el viento en calma y cuando no llueva preferiblemente en época de pre-floración, a primeras horas

**SUSPENSION CONCENTRADA (SC)
FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Composición Química:

(% p/v):

INGREDIENTE ACTIVO:

Clorotalonil.....50

50

cimoxanilo.....10

10

Aditivos.....

.....40

Contiene 600 g de I.A. por litro de producto comercial.

“NO ALMACENAR EN EL HOGAR MANTENGASE EN UN LUGAR CERRADO Y FRESCO. ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICINAS”.

Nº REGISTRO INSAI



**TITULAR DEL REGISTRO
AGROCASA , C.A**

FABRICADO POR:

JIANGYIN SULI CHEMICAL CO., LTD. ADD: N° 7, RUNHUA ROAD, LIGANG TOWN, JIANGYN CITY CHINA.

SHANGHAI SHENGLIAN CHEMICAL CO., LTD. ADD N° 59 ZHAI XING ROAD ZHELIN TOWN FENGXIAN DISTRICT SHANGHAI 201416 -CHINA.

FORMULADO POR:

**AGROCASA , C.A DIRECCIÓN: URB. SAN JOSÉ DE TARBES AV. 96-B, CENTRO TARBES 138, PISO 4, OFIC. 4-2 Y 4-3 VALENCIA
Teléfonos: (0241) 8244492-8242270 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

**DISTRIBUIDO POR:
AGROCASA , C.A**

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

LOTE:

CONTENIDO NETO: 1l - 4l - 500ml

INSTRUCCIONES DE USO

TALOXIL: Es un fungicida de amplio espectro de acción preventivo - curativo que actúa inhibiendo el proceso de germinación y desarrollo de hongos. Compuesto por Clorotalonil y Cymoxanil actúa por con acción de contacto sistémico y translaminar, por lo que su efecto es rápido y prolongado protegiendo el cultivo por dentro y por fuera.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

PLAGAS A CONTROLAR Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS L/Ha
papa	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplíquese preventivamente cada 7-15 días según las condiciones climáticas y de incidencia de la enfermedad. Efectuar las aplicaciones en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas. Cubra uniformemente el follaje de las plantas. Cuando las condiciones del tiempo sean aun mas propicias para el desarrollo de la enfermedad, acorte el intervalo de aplicación de 4-5 días.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas mínimo después de la aplicación

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de mezclar con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad a los cultivos.

TOLERANCIA EN PAPA: 0.01mg/Kg

EQUIPO UTILIZADO Y PREPARACION DE LA MEZCLA:

TALOXIL: Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar adicione la cantidad requerida de **TALOXIL** y termine de llenar el tanque con agua con agua limpia. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El quipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente

agua y jabón después de cada jornada de trabajo.. Debe ser aplicado en su totalidad inmediatamente, no se debe guardar para el día siguiente.

DECLARACIÓN: “EL TITULAR DEL REGISTRO GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO CONTENIDO EN ESTE ENVASE CORRESPONDEN A LAS ANOTADAS EN LA ETIQUETA Y QUE ES EFICAZ PARA LOS



LIGERAMENTE TOXICO



